

Základní znaky velkých hub (makromycetů)



Martin Kříž

Použitý zdroj pérovek:

Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy.
Academia, Praha (str. 11 – 43).

Úpravy prezentace: 2019 (doplněná verze), 2021 (přidána *Desmazierella*), 2022, 2025 (další doplnění)



Základní dělení **velkých hub** (podtržení: kde je jich nejvíce zahrnuto)

Říše Fungi


I. Vřeckovýtrusé houby (oddělení Ascomycota)

- třídy: Neoelectomycetes, Pezizomycetes, Eurotiomycetes, Leotiomycetes, Orbiliomycetes, Sordariomycetes

II. Stopkovýtrusé houby (oddělení Basidiomycota)

- třídy: Pucciniomycetes, Ustilaginomycetes, Atractiellomycetes, Exobasidiomycetes, Tremellomycetes, Dacrymycetes, Agaricomycetes

Typy plodnic a stromat vřeckovýtrusých hub (Ascomycota)



1) Apothecium

(pohárovitá, miskovitá nebo terčovitá plodnice, přisedlá nebo s různě dlouhou stopkou, u některých rodů výrazně modifikovaná) → terčoplodé houby (diskomycety).



2) Kleistothecium

(uzavřená kulovitá plodnice se zřetelně vyvinutou stěnou a vřečky rozptýlenými uvnitř)

3) Perithecium


(kulovitá, hruškovitá až lahvicovitá plodnice s rouškem na dně a bocích vnitřní dutiny a na vrcholu s malým otvorem – ústím; často tvoří kompaktní shluky zvané stromata – 3a) → tvrdohouby (pyrenomycety).

Apothecium – příčný řez, detail rouška (hymenium, thecium)



← Vřečka a parafýzy

Typy vřecek podle jejich
otevíracího aparátu:
operkulátní (s víčkem) a
inoperkulátní (s otvorem
na vrcholu) →



Apothecium beze stopky – *Aleuria aurantia*



Krátce stopkaté apothecium s anamorvou – *Holwaya mucida*



Dlouze stopkaté apothecium – *Microstoma protractum*



Apothecium s chlupy na vnější straně – *Scutellinia scutellata*



Apothecium s chlupy i v theciu – *Desmazierella acicola*



Jazykovité apothecium – *Trichoglossum hirsutum*



Modifikované apothecium s třeněm – *Gyromitra gigas*




Silně modifikované apothecium (tuberothecium) – *Tuber aestivum*



Apothecium rosolovit  konzistence – *Ascotremella faginea*



Kleistothecium – příčný řez (zjednodušené schema)



Zdroj: <http://femsre.oxfordjournals.org/content/36/1/165>



Kleistothecium – *Elaphomyces granulatus*



Kleistothecium – *Elaphomyces muricatus*



Perithecium – příčný řez a stroma (rostoucí na dřevě)



Perithecium (nestromatický pyrenomycet) – *Leptosphaeria acuta*




Stromatický pyrenomycet – *Camarops tubulina*




Stromatický pyrenomycet se stopkou – *Ophiocordyceps gracilis*




Typy plodnic stopkovýtrusých hub (Basidiomycota)




- Nižší stopkovýtrusé houby (heterobasidiomycety) – mají většinou přehrádkované bazidie a často rosolovitou konzistenci



- Nelupenaté houby: plodnice vzpřímené (liškovité, kuřátkovité, kyjovité), bokem přirostlé (chorošovité), rozlité (kornatcovité), s ostnitým hymenoforem – vzpřímené i bokem přirostlé




- Lupenaté a hříbovité houby (některé lupenaté nemají třeň a jsou bokem přirostlé; hříbovité mají plodnice s rourkami)



- Břichatky: hypogeické (hlízovité až kulovité) a epigeické (různých tvarů)


Bazidie

← Vývoj bazidie a vznik výtrusů (bazidiospor)



Typy bazidií:

1: příčně dělená (boltcovitka – *Auricularia*), 2: podélně dělená (rosolovka – *Tremella*), různé typy nedělených – 3: se zduřelými a přehrádkou oddělenými sterigmaty, správněji haplocyty (tulasneovka – *Tulasnella*), 4: vidlicovitě rozdělená (kropilka – *Dacrymyces*), 5: s 8 sterigmaty (rozděrka – *Sistotrema*), 6: se 4 sterigmaty (šupinovka – *Pholiota*), 7: s 2 sterigmaty (kuřátečko – *Clavulina*), 8: s velmi krátkými sterigmaty (hvězdovka – *Geastrum*), 9: s velmi dlouhými sterigmaty a výtrusy v ose sterigmatu (prášivka – *Bovista*)



Příčně dělené bazidie – *Auricularia auricula-judae*



Podélně dělené bazidie – *Tremella mesenterica*




Bazidie se zduřelými sterigmaty – *Tulasnella violea*



Vidlicovitě rozdělené bazidie – *Calocera viscosa*




Typy hymenoforu stopkovýtrusých hub, schéma příčného řezu




- Ostny (např. lošákovité houby a rody *Hericium*, *Creolophus*, *Dentipellis*, *Steccherinum*, *Sarcodontia*, *Auriscalpium*, *Gloiodon*, *Climacodon*, *Pseudohydnum*)
- Lupeny: houby s dužninou nevláknitou (holubinky – *Russula* a ryzce – *Lactarius*) a vláknitou (všechny ostatní)
- Rourky (chorošovité a hřibovité houby)

→ Plochu hymenoforu pokrývá rouško (hymenium).


Typy hymenoforu na příkladu polorozlitých plodnic




1




2




3




4




5



6



7



8

1 – hladký

2 – hrbokatý (tuberkulátní)

3 – zoubkatý (odontoidní)

4 – ostnitý (hydroidní)

5 – žilnatý (phlebioidní)

6 – síťnatě žilnatý (meruloidní)

7 – rourkatý (poroidní)

8 – lupenitý (lamelloidní)

+

9 – jemně zrnitý (grandinioidní)

10 – nepravidelně zubatý
(irpikoidní)

Hladký hymenofor – *Stereum hirsutum*



Jemně zrnitý hymenofor – *Resinicium bicolor*



Zoubkatý hymenofor – *Hyphodontia pruni*



Hrbolkatý hymenofor – *Cystostereum murrayi*



Ostnitý hymenofor – *Hydnum repandum*



Nepravidelně zubatý hymenofor – *Irpex lacteus*



Žilnatý hymenofor – *Phlebia centrifuga*



Sít'natě žilnatý hymenofor – *Phlebia rufa*




Rourkatý hymenofor (póry drobné) – *Polyporus ciliatus*



Rourkatý hymenofor (póry veľké) – *Polyporus alveolaris*



Rourkatý hymenofor (póry protáhlé) – *Trametes gibbosa*



Rourkatý hymenofor (póry protáhle sít'naté) – *Daedalea quercina*



Lupenitý hymenofor (lupeny síťnaté) – *Gloiocephala menieri*




Lupenitý hymenofor (lupeny řídké) – *Megacollybia platyphylla*



Lupenitý hymenofor (lupeny husté) – *Lactarius piperatus*



Základní tvary plodnic stopkovýtrusých hub



1 – rozlitá plodnice

2 – polorozlitá plodnice

3 – bokem přirostlá kloboukatá plodnice

4 – kloboukatá plodnice s postranním třeněm

5 – kloboukatá plodnice s výstředným třeněm

6 – kloboukatá plodnice se středovým třeněm

Rozlitá plodnice (hladká) – *Botryohypochnus isabellinus*



Rozlitá plodnice (síťnatě žilnatá) – *Serpula lacrymans*



Rozlitá plodnice (rourkatá) – *Schizopora radula*



Polorozlitá plodnice (hladká) – *Stereum gausapatum*



Polorozlitá plodnice (rourkatá) – *Skeletocutis nemoralis*



Bokem přirostlá kloboukatá plodnice – *Fomes fomentarius*



Kloboukatá plodnice s postranním třeněm – *Pleurotus pulmonarius*



Kloboukatá plodnice s výstředným třeněm – *Ossicaulis lachnopus*




Kloboukatá plodnice se středovým třeněm – *Entoloma sinuatum*




Vývoj plodnic stopkovýtrusých hub a jejich obalů

1




1 – plodnice bez obalů

2



2 – plodnice s částečným obalem (velum parziale)

3



3 – plodnice s částečným (velum parziale) i celkovým obalem (velum universale)

Plodnice bez obalů (s lupeny) – *Hygrocybe coccinea*



Plodnice bez obalů (s rourkami) – *Suillus bovinus*



Plodnice s částečným obalem (s rourkami) – *Suillus grevillei*



Plodnice s částečným obalem (s lupeny) – *Limacella guttata*




Plodnice s celkovým obalem – *Amanita submembranacea*



Plodnice s částečným i celkovým obalem – *Amanita pantherina*



Postava plodnic u lupenatých a hřibovitých hub



1 – plodnice vzhledu špiček

2 – plodnice vzhledu penízovek

3 – plodnice vzhledu helmovek

4 – plodnice vzhledu kalichovek

5 – plodnice vzhledu strmělek

6 – plodnice vzhledu čirůvek

7 – plodnice vzhledu hřibů

8 – plodnice vzhledu hlív

9 – plodnice vzhledu trepkovitek

Plodnice vzhledu špiček – *Marasmius curreyi*



Plodnice vzhledu penízovek – *Gymnopus erythropus*



Plodnice vzhledu helmovek – *Mycena arcangeliana*



Plodnice vzhledu kalichovek – *Lichenomphalia umbellifera*



Plodnice vzhledu kalichovek – *Entoloma rhodocylix*



Plodnice vzhledu strmělek – *Clitocybe diatreta*



Plodnice vzhledu čirůvek – *Tricholoma vaccinum*



Plodnice vzhledu hřibů – *Boletus aereus*




Plodnice vzhledu hlív – *Pleurotus ostreatus*



Plodnice vzhledu trepkovitek – *Crepidotus applanatus*



Tvar klobouku stopkovýtřusých hub



1 – polokulovitý

2 – vyklenutý

3 – paraboloidní

4 – zvoncovitý

5 – kuželovitý

6 – vyklenutý s hrbolem

7 – plochý

8 – prohloubený

9 – nálevkovitý

10 – vyklenutý s prohloubeným středem

11 – okraj klobouku podehnutý

12 – okraj klobouku podvinutý

Polokulovitý klobouk – *Conocybe semiglobata*



Vyklenutý klobouk – *Boletus edulis*



Paraboloidní klobouk – *Galerina hypnorum*



Zvoncovitý klobouk – *Cortinarius semisanguineus*



Zvoncovitý klobouk s úzkým hrbolkem – *Psilocybe semilanceata*



Kuželovitý klobouk – *Hygrocybe conica* var. *conicopalustris*



Vyklenutý klobouk s hrbolem – *Hymenopellis radicata*



Plochý klobouk – *Amanita muscaria*



Prohloubený klobouk – *Hygrophorus arbustivus*



Nálevkovitý klobouk – *Craterellus tubaeformis*



Vyklenutý klobouk s prohloubeným středem – *Lentinus tigrinus*




Okraj klobouku podehnutý – *Loreleia marchantiae*



Okraj klobouku podvinutý – *Paxillus rubicundulus*



Připojení lupenů ke třeni



1 – odsedlé

2 – volné

3 – úzce připojené

4 – široce připojené

5 – široce připojené a
zoubkem sbíhavé

6 – vykrojené

7 – vykrojené a zoubkem
sbíhavé

8 – sbíhavé

Odsedlé lupeny – *Pluteus cervinus*



Volné lupeny – *Agaricus sylvaticus*



Úzce připojené lupeny – *Entoloma vernum*



Široce připojené lupeny – *Hygrophorus marzuolus*



Široce připojené a zoubkem sbíhavé lupeny – *Gamundia striatula*



Vykrojené lupeny – *Melanoleuca cognata*




Vykrojené a zoubkem sbíhavé lupeny – *Calocybe carnea*



Sbíhavé lupeny – *Cuphophyllus virgineus*



Typy hyf stopkovýtrusých hub



- 1 – generativní s přezkami
(mohou být i bez přezek)
- 2 – vazbové (ligativní)
- 3 – skeletové
- 4 – gloeoplerní

Hyfový systém

- monomitický: pouze generativní hyfy
- dimitický: generativní + skeletové hyfy
- trimitický: generativní + skeletové + vazbové hyfy

Momonitický hyfový systém – *Imleria badia*




Dimitický hyfový systém – *Bondarzewia mesenterica*



Trimitický hyfový systém – *Trametes versicolor*




Tvary výtrusů (jen základní tvary)




1: kulovitý, 2: elipsoidní, 3: vejčitý, 4: obvejčitý, 5: vřetenovitý, 6: mandlovitý, 7: citronovitý, 8: válcovitý, 9: ledvinitý, 10: úzce ledvinitý (uzenkovitý, alantoidní), 11: kapkovitý, 12: hranatý, 13: jehlicovitý a přehrádkovaný, 14: vláknitý a přehrádkovaný


Ornamentika výtrusů



bradavčitá



hrbolkatá



ostnitá




vrásčitá



žebnatá



křídlatá



sít'natá



kalyptrátní

Výtrusy kulovité, hladké – *Amanita citrina*



Výtrusy kulovité, ostnité – *Rhodotus palmatus*



Výtrusy elipsoidní, hladké – *Clitocybe nebularis*



Výtrusy elipsoidní, bradavčité – *Cortinarius bulliardii*



Výtrusy vejčité, hladké – *Coprinus comatus*



Výtrusy obvejčité, hladké – *Arrhenia obscurata*



Výtrusy vřetenovité, hladké – *Coniophora fusispora*



Výtrusy mandlovité, hladké – *Inocybe godeyi*



Výtrusy citronovité, bradavčité – *Lacrymaria lacrymabunda*



Výtrusy válcovité, hladké – *Polyporus umbellatus*



Výtrusy ledvinité, hladké – *Exidia nigricans*



Výtrusy úzce ledvinité (uzenkovité), hladké – *Postia alni*




Výtrusy kapkovité, hladké – *Cylindrobasidium evolvens*



Výtrusy hranaté, hladké – *Entoloma mougeotii*



Břichatky (gasteromycety)



Hypogeická (podzemní) břichatka – *Hymenogaster bulliardii*



Mykorhizní břichatka – *Scleroderma citrinum*



Mykorhizní břichatka – *Pisolithus arhizus*



Koprofilní břichatka – *Cyathus stercoreus*



Lignikolní břichatka – *Sphaerobolus stellatus*



Terestrická břichatka s třeněm – *Tulostoma kotlabae*



Terestrická břichatka, teřich uvnitř – *Geastrum granulatum*



Terestrická břichatka, teřich vně – *Clathrus archeri*



Terestrická břichatka, teřich vně – *Phallus impudicus*

